

Rôle de la réanimation dans la prise en charge post-opératoire des chirurgies carcinologiques majeures

KHELIFI A, REZOUG N , TALBI M , BEKAOUI R , REZGUI I , FERKA ZAZOU A, GHOMARI W

Service d'anesthésie- réanimation, hôpital mixte de lutte contre le cancer, Sidi-Bel-Abbès

Introduction : La chirurgie carcinologique majeure expose à un risque élevé de complications précoces, notamment chez des patients fragiles et polyopathologiques. La surveillance post-opératoire en réanimation pourrait permettre une détection précoce de ces complications et une amélioration du pronostic.

Méthodes : Étude rétrospective descriptive menée sur une période de 3 mois en unité de réanimation du service d'anesthésie réanimation au niveau de l'HMLCC de Sidi Bel Abbès. Ont été inclus les patients admis pour surveillance post-opératoire après chirurgie carcinologique majeure. Les données analysées comprenaient les données épidémiologiques des patients, les facteurs de comorbidité, la phase per opératoire, ainsi que les complications survenues en post opératoire, la durée de séjour et leur devenir.

Résultats : quatorze patients ont été inclus, 65% étaient âgés de plus de 50 ans, 80% à haut risque (ASA \geq II), 57% ont bénéficié d'une chirurgie digestive, 43 % d'une chirurgie thoracique, La durée de l'intervention chirurgicale était en moyenne de 6h, **une transfusion était nécessaire dans 60 % des cas et l'introduction d'amines vasopressives dans 50 % des cas.** La surveillance en réanimation a permis la **détection précoce et la prise en charge rapide de complications** infectieuses telles les pneumopathies, de complications hémorragiques, ou de troubles hydro-électrolytiques. La durée moyenne de séjour était de 6 jours. Une évolution favorable a été notée chez 70 % des patients, permettant leur transfert vers le service d'origine après stabilisation, tandis que les 30 % restants ont présenté des complications et évolué défavorablement vers le décès malgré les mesures de réanimation.

Conclusion : La surveillance post-opératoire en réanimation des patients, après chirurgie carcinologique majeure, permet une **détection précoce des complications** et une **prise en charge rapide**, contribuant à améliorer le devenir des patients en phase post-opératoire.