

Métastase musculaire révélatrice d'un carcinome urothélial de la vessie : à propos d'une observation et revue de la littérature.

1. Zahi Nesrine .2 Zidane Habib.

Adresse e-mail : nesrine.zahi@univ-mosta.dz

1,2 Faculté de médecine de Mostaganem, CHU de Mostaganem, service d'oncologie médicale.

INTRODUCTION :

les carcinomes de la vessie sont connus pour donner de multiples formes d'atteinte métastatique . La localisation métastatique musculaire est très inhabituelle.

OBSERVATION :

Patient K. A âgé de 54 ans, non tabagique, a consulté pour une tuméfaction de la face postérieure de la cuisse gauche. À l'interrogatoire on retrouve la notion d'une hématurie intermittente associée à des troubles mictionnels. L'uroscanner objectivait un processus vésical multifocal infiltrant la graisse locorégionale. L'IRM de la cuisse a objectivé une masse de la face postéro interne de la cuisse gauche étendue de sa racine jusqu'au tiers moyen. Une résection transurétrale de la vessie (RTUV) a été réalisée, l'examen anatomopathologie des copeaux de résection a révélé un carcinome urothélial papillaire de haut grade . la biopsie de la masse a conclu à une localisation secondaire d'un carcinome urothélial . La décision thérapeutique était de commencer une poly-chimiothérapie à base de Gemcitabine et Cisplatine . L'évolution a été marquée par l'altération de l'état général du patient

CONCLUSION :

La métastase musculaire est un événement rare au cours de l'évolution du carcinome urothélial de la vessie . Ses manifestations cliniques sont souvent trompeuses conduisant à un retard diagnostique.

Mots clés : métastase musculaire, carcinome urothélial.